Dr. Iulia & Dragos
MURARU
CHIRURGIE ESTETICA
SI RECONSTRUCTIVA



DR. IULIA &
DR. DRAGOȘ MURARU


AUGMENTAREA MAMARĂ CU IMPLANTURI

GHID COMPLET DE LA A - Z

TOT CE TREBUIE SĂ ȘTII DESPRE AUGMENTAREA MAMARĂ CU IMPLANTURI

Dr. Iulia & Dragos
MURARU
CHIRURGIE ESTETICA
SI RECONSTRUCTIVA

CUI SE ADRESEAZĂ ACEST GHID?



Dacă iei în considerare să îți faci o augmentare mamară, acest ghid este pentru tine.
Sunt, fără îndoială, multe întrebări pentru care ai nevoie de răspunsuri, iar acest ghid îți va acoperi toate întrebările la care te-ai gândit, dar și altele la care probabil nu te-ai fi gândit.

În cazul în care vei avea totuși orice altă întrebare care nu a fost acoperită cu un răspuns aici, te rugăm să ne contactezi. Vom fi bucuroși să îți oferim răspuns la orice dilemă pe care o ai pe acest subiect.

Continuă să citești pentru a obține toate informațiile esențiale despre augmentarea mamară, într-un mod cât mai simplu și cât mai ușor de înțeles.



CE ÎNSEAMNĂ AUGMENTAREA MAMARĂ?

Pe scurt, augmentarea mamară cu implant reprezintă modalitatea chirurgicală de mărire a sânilor. Prin poziționarea unor implanturi saline sau siliconice, fie deasupra, fie sub mușchiul pectoral, se obține îmbunătățirea aspectului sânilor.

Atunci când este efectuată corect, augmentarea mamară este o adevărată artă.

Când vei lua decizia de a apela la intervenție, lasă-te ghidată de noi. Vom lua în calcul dorințele tale, starea ta de sănătate și tot ceea ce va fi nevoie, astfel încât tu să obții cele mai bune rezultate, pentru tine și corpul tău.

Dr. Iulia & Dragos MURARU
CHIRURGIE ESTETICA SI RECONSTRUCTIVA



AM NEVOIE DE AUGMENTARE MAMARĂ?

Mărirea sânilor poate fi o opțiune pentru tine dacă:

- nu ai probleme majore de sănătate
- unul sau ambii sâni nu s-au dezvoltat normal
- consideri că ai sânii prea mici, iar asta îți afectează stima de sine
- ești nemulțumită de forma sau volumul sânilor tăi după ce ai născut, după ce ai slăbit sau ai înaintat în vârstă, iar sânii tăi și-au pierdut din fermitate.

AM NEVOIE DE RIDICARE DE SÂNI SAU DE AUGMENTARE MAMARĂ?

Pentru unele persoane care își doresc mărirea sânilor, poate fi mai benefică ridicarea acestora. Acest lucru se stabilește în funcție de aspectul sânilor.

Dacă ai sânii suficient de mari, însă sunt prea lăsați pentru gustul tău, atunci o ridicare a sânilor poate fi mai potrivită. Aceasta îți poate repoziționa sânii, fără să îi micșoreze.

Dacă însă nu există suficient volum, o mărire a sânilor poate fi răspunsul.

În anumite cazuri, este necesară asocierea unei intervenții de ridicare a sânilor celei de augmentare mamară. Mărirea va adăuga volumul dorit, în timp ce liftingul mamar va poziționa sânii în mod corespunzător și va corecta ptoza mamară (lăsarea sânilor).

Însă, cel mai indicat este să iei această decizie împreună cu medicul tău plastician, Dr. Iulia Muraru sau Dr. Dragoș Muraru, care te va ghida, astfel încât tu să iei cea mai bună decizie pentru tine și corpul tău.

TIPURI DE IMPLANTURI

Implanturi saline

Aceste implanturi sunt compuse în principal din apă sărată sterilă, ser fiziologic, care este de fapt același tip de soluție salină existentă în mod natural în corpul uman.

Implanturile saline dau o senzație mai fermă decât cele din gel de silicon, însă, la atingere sânii nu se simt la fel de naturali ca cei cu implanturi cu silicon.
În cazul în care un implant salin se fisurează, acesta se va dezumfla, însă serul va fi absorbit și eliminat natural de corp.

Implanturile cu suprafață poliuretanică

Implanturile cu înveliș poliuretanic sunt asemănătoare ca formă și structură cu cele siliconice, diferența fiind dată de suprafața din poliuretan a acestor implanturi.

Aceasta este asemănătoare cu un burete fin, ce devine extrem de aderent la contactul cu țesuturile înconjurătoare, făcându-l foarte stabil în timp și scăzând la minimum riscul de rotație sau deplasare.

Implanturile cu silicon

Acest tip de implanturi conține un gel coeziv de silicon. Acestea își păstrează forma după amplasare și imită îndeaproape țesutul mamar, oferind o senzație și un aspect mult mai apropiat de țesutul natural al sânului, decât implanturile cu ser fiziologic.
Implanturile cu silicon au un volum pre-setat, dar sunt disponibile într-o mare varietate de dimensiuni.

În cazul în care implantul va prezenta scurgeri, gelul va rămâne în capsula lui sau poate aluneca în buzunarul implantului, fără însă să se dezumfle, ca cel din ser fiziologic. Pentru acest tip de implant mamar se recomandă consultații periodice, pentru a te asigura că implantul tău este intact. O ecografie mamară anuală sau o examinare prin rezonanță magnetică pot evalua starea implantului.

Noi, Dr. Iulia Muraru și Dr. Dragoș Muraru optăm pentru implanturile cu silicon și folosim doar implanturi premium. Producătorul implanturilor oferă o garanție pe viață în cazul rupturii implanturilor, iar dacă acest lucru se produce în primii 10 ani de la intervenție, susține și o parte din contravaloarea intervenției pentru înlocuirea acestora, de până la 1000 de euro. De asemenea, oferă o garanție de 10 ani, în cazul în care implanturile trebuiesc îndepărtate, din cauza unei contracturi capsulare sau în urma unui serom tardiv.

Dr. Iulia & Dragos
MURARU
CHIRURGIE ESTETICA
SI RECONSTRUCTIVA

FORME DE IMPLANTURI



Există două forme de implanturi: rotund și anatomic.
Cel mai folosit implant în România este implantul în formă rotundă.

Forma anatomică, cea cu aspect de lacrimă, crește și ea foarte mult în popularitate. Acest tip de implant este ideal pentru tine dacă vrei să subliniezi partea inferioară a sânului. Implantul anatomic are un aspect mai natural.
În schimb, cel rotund este ideal pentru tine, dacă ai un stil de viață mai activ, pentru că nu există riscul de inversare a formei, prin rotire.
Forma implantului depinde, în mare parte, de forma pe care tu ți-o dorești pentru sânii tăi, însă trebuie să ții cont și de conformația corpului tău. Acest lucru se stabilește împreună cu medicul.



MĂRIMEA IMPLANTULUI

Tipul implantului și mărimea lui vor fi determinate, nu doar de creșterea în volum pe care o dorești, ci mai ales de anatomia sânului, de elasticitatea pielii și de forma corpului tău.

Așa că, atunci când vei ajunge la consultație, îți recomandăm să fii foarte deschisă cu privire la așteptările tale.

Dacă ne alegi pe noi, cu siguranță te vom ghida să alegi cea mai potrivită mărime și formă pentru corpul tău, astfel încât tu să obții rezultatele dorite.

TIPURILE DE INCIZII

Inciziile sunt efectuate în zone ascunse, pentru a reduce vizibilitatea cicatricelor rezultate în urma augmentării mamare.

Inciziile variază în funcție de tipul de implant mamar ales, mărimea acestuia, anatomia corpului tău, dar și preferințele personale.

Chirurgul tău te va ghida, în alegerea cea mai potrivită pentru tine și corpul tău.

Tipuri de incizii:

- incizia în șanțul submamar - poziționată sub sân;
- incizia transaxilară - poziționată la nivelul zonei axilare, a subrațului;
- incizia periareolară - poziționată la nivelul marginii inferioare a areolei.

Chirurgul închide inciziile cu suturi stratificate folosind, de obicei, fire resorbabile. La început, în următoarele luni, liniile de incizie vor fi vizibile. Ulterior, acestea se vor estompa semnificativ, însă nu vor dispărea complet.

Chiar dacă vindecarea inciziilor se face în aproximativ 2 săptămâni, maturarea țesutului cicatriceal (aspectul estetic maxim) se face la aproximativ un an postoperator.



Dr. Iulia & Dragos MURARU
CHIRURGIE ESTETICA SI RECONSTRUCTIVA

INSERAREA ȘI AMPLASAREA IMPLANTULUI



După efectuarea inciziei, implantul este inserat într-un buzunar creat special, sub mușchiul pectoral (submuscular) sau direct sub țesutul mamar (în spatele glandei mamare).

Amplasarea SUBMUSCULARĂ

Implanturile sunt amplasate în interiorul unui buzunar creat sub mușchiul pectoral. Poate fi nevoie de o ușoară întindere a mușchiului pentru a se acomoda cu implantul. Implantul inserat submuscular este, în general, considerat a fi mai sigur, deoarece implantul este ținut într-un buzunar, sub mușchi.

Tipul de amplasare va depinde de mai mulți factori, inclusiv de tipul de corp și de dorințe personale. În anumite situații, pacientele pot necesita un anumit tip de amplasare.
De exemplu, sportivii necesită adesea o amplasare subglandulară, astfel încât să nu interfereze cu funcția mușchiului lor pectoral.

În general, implanturile sunt mai ușor camuflate și au un aspect mai natural în cazul amplasării submusculare.


Amplasarea SUBGLANDULARĂ

Prin acest tip de poziționare, implantul este inserat într-un buzunar creat sub glanda mamară, deasupra mușchiului pectoral. Astfel, mușchiul pectoral nu este afectat, iar recuperarea postoperatorie este mai ușoară. Cu toate acestea, acest tip de poziționare este mult mai probabil să faciliteze migrarea implantului, decât amplasarea submusculară. În plus, la pacientele foarte slabe, cu un țesut subcutanat slab reprezentat, există riscul ca marginile implanturilor să fie vizibile, mai ales în polul superior, la nivelul decolteului.

Metoda aleasă diferă în funcție de tipul implantului, mărimea lui, forma corpului tău și de recomandările chirurgului tău.
În majoritatea cazurilor, noi optăm pentru amplasarea în planul submuscular, deoarece oferă o acoperire bună a implantului în zona sa superioară, obținând astfel un rezultat cu un aspect mai natural.

Dr. Iulia & Dragos MURARU
CHIRURGIE ESTETICA SI RECONSTRUCTIVA

ÎNAINTE DE INTERVENȚIE



Înainte de procedura de mărire a sânilor, există câteva lucruri importante pe care trebuie să le faci pentru a te pregăti corect de intervenție.

În felul acesta, poți avea o recuperare mai ușoară și mai rapidă.

PUNE ÎNTREBĂRI

În cazul în care ai întrebări la care nu ai primit răspuns în acest ghid, te rugăm să ne contactezi. Ne dorim ca pacienții să fie cât mai bine informați.

În acest ghid vei afla tot ce ai nevoie să știi, însă vor fi întrebări și decizii de luat împreună cu medicul tău.

Pentru acestea, momentul ideal pentru a pune întrebări este în timpul consultației.

Dr. Iulia & Dragos MURARU
CHIRURGIE ESTETICA SI RECONSTRUCTIVA

PREGĂTIREA PENTRU INTERVENȚIE

Chirurgia necesită în general mai mulți pași.

Pentru a ne asigura că totul este în regulă și că nu există probleme de sănătate care ar putea împiedica intervenția chirurgicală, sunt necesare o serie de analize și efectuarea unei ecografii mamare cu scor BIRADS, precum și o electrocardiogramă.


Cu minimum două săptămâni înainte de intervenție te vom programa la un consult preanestezic, cu medicul anestezist, pentru evaluarea riscurilor preanestezice.

După ultima examinare făcută de Dr. Iulia Muraru sau Dr. Dragoș Muraru, vei primi toate instrucțiunile necesare.

Dacă ești fumătoare, trebuie să întrerupi fumatul cu minimum 3 săptămâni înainte de intervenție (inclusiv țigările electronice sau e-cigarette).
Cu cât întrerupi fumatul mai devreme de intervenția chirurgicală, cu atât mai bine. Asigură-te să ne informezi corect referitor la timpul care a trecut de când ai fumat ultima țigară.

Dacă iei medicamente, indiferent dacă sunt sau nu prescrise de medic, este posibil să venim cu anumite recomandări în acest sens. Unele medicamente cum ar fi ibuprofenul, sau anumite suplimente pe bază de plante, pot cauza subțierea sângelui, ceea ce poate fi periculos în timpul intervenției.

Poate fi necesară încetarea acestor medicamente pentru o săptămână sau chiar mai multe, înainte de intervenție, pentru a ne asigura că operația va decurge cât se poate de bine și în deplină siguranță.



CERCETARE

Unul dintre cele mai importante lucruri pe care trebuie să le faci înainte de operație, este cercetarea. Asigură-te că înțelegi pe deplin ceea ce implică intervenția.

Deși nu este o intervenție majoră, iar noi vom avea grijă ca totul să decurgă bine și în deplină siguranță, este totuși o intervenție chirurgicală și trebuie tratată ca atare. Așa că, te sfătuim să cercetezi înainte, pentru a-ți face o idee cât mai completă despre ceea ce îți dorești și ceea ce implică această intervenție.

Dr. Iulia & Dragos
MURARU
CHIRURGIE ESTETICA
SI RECONSTRUCTIVA

ÎN ZIUA INTERVENȚIEI




Este important să nu consumi lichide sau alimente, înainte cu 6-8 ore până la intervenție.

Te așteptăm cu aproximativ o oră înaintea orei programate pentru intervenție, astfel încât să ne putem ocupa de documentație și de pregătirea necesară intervenției.

Nu uita să aduci un act de identitate și toate rezultatele analizelor solicitate anterior. Ca orice altă intervenție, și aceasta presupune semnarea în prealabil a consimțămintelor aferente, așa că este bine să îți acorzi timp pentru a citi toate informațiile legate de intervenție, înainte de a le semna.

Pentru orice nelămurire sau neclaritate, medicii noștri îți vor sta la dispoziție cu informații și cu tot suportul necesar.

RECUPERAREA. LA CE SĂ TE AȘTEPȚI DUPĂ OPERAȚIE



După operație îți va fi administrat un tratament antibiotic pentru prevenirea infecțiilor, precum și alte medicamente menite să reducă durerea și inflamația. În primele 2-3 zile durerile sunt, de obicei, mai intense și necesită antialgice. În majoritatea cazurilor, durerea cedează la analgezice și antiinflamatoare uzuale (ibuprofen, paracetamol, ketonal), iar tratamentul nu este necesar pentru o perioadă mai mare de o săptămână după intervenție.

Noi te vom pune la curent cu toate aceste informații și vei primi instrucțiuni specifice cazului tău, privind recuperarea. Aceste informații vor include: îngrijirea postoperatorie, medicamentele necesare pentru vindecare și pentru reducerea riscului de infecție, precum și informații privind data la care trebuie să revii pentru consultațiile de control postoperator.

Respectarea indicațiilor medicului chirurg este cheia reușitei operației tale. Pentru a avea o vindecare optimă, te sfătuim să ții cont de toate aspectele care urmează a fi descrise în continuare.

TIMP LIBER

Deși există mai mulți factori care influențează recuperarea, cel mai probabil vei avea nevoie de 24-48 de ore pentru a-ți reveni după operație și o perioadă de câteva zile de reducere a activității uzuale.
În cele mai multe cazuri, poți reveni la serviciu sau la activitățile curente în câteva zile, însă, este bine să iei în calcul o săptămână liberă pentru recuperare.
Dacă jobul tău necesită activități fizice majore, ridicare sau mișcare intensă, este posibil să ai nevoie de mai mult timp liber.

Chirurgul tău va avea grijă să îți furnizeze toate aceste informații în funcție de situația ta specifică.

SPORT ȘI EFORT FIZIC

Este important ca inciziile chirurgicale să nu fie supuse traumelor, frecării sau mișcării în timpul perioadei de recuperare. Sportul și efortul fizic după o mărire a sânilor ar trebui abordate cu prudență. Exercițiile ușoare pot fi efectuate, după ce se încheie perioada imediată de recuperare, însă nimic dificil.

Jogging-ul, alergarea și alte activități de genul acesta ar trebui evitate cel puțin trei săptămâni. Orice exercițiu intens trebuie exclus complet, timp de minimum șase săptămâni.

Este indicat să eviți orice contact fizic cu sânii (cu excepția bustierei speciale) timp de aproximativ trei până la patru săptămâni. Cicatricile ar trebui să se estompeze și să se aplaneze, de la trei luni la doi ani după operație, în funcție de cum reacționează organismul tău la vindecare.

CÂND SĂ CUMPERI SUTIENE NOI

Postoperator, vei primi un sutien special, mai exact o bustieră compresivă. Aceasta va fi adaptată special pentru tine și o vei purta începând din a doua zi după operație. În funcție de situația ta specifică, bustiera trebuie folosită pentru o perioada de câteva săptămâni, fără întrerupere.

Noi, Dr. Iulia Muraru sau Dr. Dragoș Muraru, îți vom oferi informații concrete și specifice cazului tău. De regulă, după maximum șase săptămâni poți cumpăra sutiene noi. Este însă indicat ca în primele luni după operație să eviți sutienele cu profil metalic, deoarece acestea pot atinge cicatricele postoperatorii, în cazul inciziilor în șanțul inframamar, și pot fi foarte incomode.

În general, după 6 luni nu mai există nicio restricție referitoare la tipul de sutien care poate fi purtat.



Dr. Iulia & Dragos
MURARU
CHIRURGIE ESTETICA
SI RECONSTRUCTIVA


EVALUAREA REZULTATELOR

Rezultatul estetic va putea fi vizibil imediat, însă la început va exista un anumit grad de edem (umflături), pot apărea echimoze (vânătăi), iar sânii vor fi în tensiune.

În timp țesuturile se vor relaxa, umflăturile și vânătăile vor dispărea, iar implanturile își vor stabiliza poziția.

Rezultatele finale vor fi vizibile după aproximativ 6 luni de la intervenție.





POSIBILE EFECTE SECUNDARE

De obicei, există o senzație de tensiune la nivelul sânilor și a pieptului, timp de câteva săptămâni. În prima săptămână disconfortul poate fi mai intens, iar inflamația sânilor destul de mare.
Senzația mamelonului se poate modifica. De asemenea, pot apărea echimoze temporare, iar sânii pot fi sensibili la stimulare, timp de câteva săptămâni.

Fiecare corp este diferit, iar organismul se va adapta la schimbările aduse, mai lent sau mai rapid, în funcție de capacitatea acestuia de adaptare la aceste schimbări, dar și de alți factori externi care îl pot influența în această perioada de recuperare.

CARE SUNT COMPLICAȚIILE CARE POT APĂREA?

Scopul acestui ghid este de a te ajuta cu toate informațiile necesare, legate de această intervenție, chiar dacă acestea sunt mai mult sau mai puțin probabile.

În marea majoritate a cazurilor, operațiile de augmentare mamară nu au generat complicații, însă orice intervenție chirurgicală este supusă unor riscuri și este bine să fim conștienți de acestea.

Cea mai discutată complicație la ora actuală este BIA-ALCL – Limfomul anaplastic cu celule mari asociat cu implantul mamar, care este o formă rară de limfom Non-Hodgkin, ce poate să apară la câțiva ani de la operație. De obicei, celulele tumorale se întâlnesc într-o acumulare de lichid (serom) din jurul implantului mamar, care duce la o umflare a sânului afectat. Tratamentul constă în îndepărtarea implanturilor împreună cu capsula ce se formează în mod natural în jurul acestora.
Este o complicație extrem de rară.

Seromul – acumularea de lichid seros în buzunarul creat pentru implantul mamar. Se poate remite, dar uneori necesită drenaj. Poate fi întâlnit imediat după operație sau la câțiva ani (seromul tardiv), caz în care trebuie obligatoriu drenat și lichidul obținut trimis pentru analize suplimentare pentru a exclude BIA-ALCL.

Hematomul – acumularea de sânge în buzunarul creat pentru implantul mamar. De regulă, cantitatea este mică și nu pune probleme, dar în cazul în care acumularea este destul de mare trebuie intervenit (drenare, reintervenție chirurgicală), altfel poate favoriza contractura capsulară și infecția.

Infecția – poate apărea la orice operație, de obicei în primele zile până la o săptămână de la intervenție, de aceea este important ca pacienta să nu aibă în momentul realizării operației vreo infecție latentă în corp. De regulă, răspunde pozitiv la tratamentul antibiotic.

Cicatrici cheloide sau cicatrici hipertrofice – cicatrici inestetice cu o anumită textură în relief și cu o culoare roșiatică. Primele apar în general la mai mult timp după operație și prezintă o creștere accentuată dincolo de marginile cicatricei inițiale, iar cele hipertrofe se observă la scurt timp după intervenție.

Deși de regulă există o predispoziție pentru ele, ambele pot fi ameliorate prin folosirea unor geluri pe bază de silicon.

Dificultăți de vindecare a plăgilor - țin de obicei de statusul biologic al pacientei.
Modificări de sensibilitate ale complexului areolo-mamelonar sau ale sânilor – hipersensibilitate, când orice atingere pe zona afectată poate fi dureroasă, sau hiposensibilitate, când zona afectată este amorțită. Acestea pot fi temporare, de la câteva săptămâni la câteva luni sau extrem de rar permanente.
Contractură capsulară – transformarea capsulei din țesut conjunctiv care se formează în mod normal în jurul implantului, prin formarea unui țesut cicatriceal ferm, dur, care sugrumă implantul și poate duce, în cazurile extreme, la ruperea acestuia. În cazurile avansate este necesară intervenția chirurgicală pentru înlăturarea capsulei și/sau înlocuirea implantului.
Incidența contracturii capsulare a scăzut foarte mult odată cu apariția noii generații de implanturi.

Migrarea implantului – schimbarea poziției implanturilor, fie rotunde, fie anatomice sau rotirea implanturilor anatomice, care poate fi dată de mai mulți factori (contractură capsulară, traumă, acțiunea gravitației, etc).
Ruptura implantului sau scurgerea acestuia – din cauza traumatismelor, a contracturii capsulare; producătorii implanturilor de top garantează în general pe viață integritatea implanturilor, asigurând schimbarea acestora, în cazul în care ruptura se produce fără o cauză evidentă.
Atrofie tisulara – subțierea în timp a țesuturilor aflate deasupra implantului.
Cudarea (plierea, plicaturarea) pielii deasupra implantului – fenomenul cunoscut sub denumirea de "rippling".
Animație, care duce la deformarea sânului - întâlnită la implanturile plasate submuscular, în care sânul este deformat la contracția mușchiului pectoral. Este o complicație rară, care se întâlnește mai des în alt tip de intervenție, reconstructivă.



Dr. Iulia & Dragos MURARU
CHIRURGIE ESTETICA SI RECONSTRUCTIVA

IMPORTANT

Decizia de a face o intervenție de creștere a sânilor este una extrem de personală. Așa că, va trebui să te hotărăști dacă beneficiile ei îți îndeplinesc scopurile, iar eventualele riscuri și complicații sunt acceptabile pentru tine.

Trebuie să știi că implanturile mamare nu sunt garantate pentru a rezista toată viața și este posibil să fie necesară o intervenție ulterioară pentru a înlocui unul sau ambele implanturi.

Sarcina, scăderea greutății sau menopauza pot influența aspectul sânilor cu implant pe parcursul vieții.

Însă, nu-ți face griji! La consultație vei înțelege mai bine tot ceea ce presupune această intervenție, iar noi îți vom explica în detaliu riscurile asociate intervenției.



CE PREȚ ARE INTERVENȚIA

Prețurile variază în funcție de tipul de implant dorit și, desigur, de complexitatea intervenției. Multe paciente doresc și ridicarea sânilor odată cu operația de implant mamar sau o simetrizare a acestora unde este cazul.
Experiența medicului contează foarte mult și împreună cu el vei stabili mărimea ideală în funcție de conformația ta, forma care ți se potrivește cel mai bine și multe alte detalii.

CE ESTE INCLUS ÎN PREȚUL INTERVENȚIEI:

- Implanturile Mamare;
- Operația de Augmentare Mamară cu Implant;
- Spitalizarea Postoperatorie;
- Mesele (mic dejun, prânz și cină);
- Bustieră obligatorie post intervenție;
- Tratamentele Medicale necesare în timpul internării;
- Anestezia și consult pre-operator anestezic de evaluare;
- Sprijin și supraveghere continuă pe perioada internării de către personal medical auxiliar specializat;
- Controale postoperatorii.

Dr. Iulia & Dragos MURARU
CHIRURGIE ESTETICA SI RECONSTRUCTIVA

CINE SUNTEM NOI



DR. DRAGOȘ MURARU

MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICĂ ȘI MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVĂ

Dr. Dragoș Muraru, medic specialist chirurgie plastică și microchirurgie reconstructivă din anul 2015, stagiul de pregătire în rezidențiat desfășurându-l în cadrul clinicii de Chirurgie Plastică-Microchirurgie Reconstructivă a Spitalului Clinic de Urgență București, sub îndrumarea domnului Prof. Dr. Ioan Lascăr, timp în care am participat la numeroase cursuri și manifestări științifice, naționale și internaționale, și am redactat numeroase lucrări științifice.

În prezent, practic chirurgia plastică și microchirurgia reconstructivă, atât în Clinica Zetta, cât și la Spitalul Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila".

DR. IULIA MURARU

MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE PLASTICA SI MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA

Dr. Iulia Muraru, absolventă a Facultății de Medicină Generală din cadrul U.M.F. „Carol Davila" București, medic specialist chirurgie plastică – microchirurgie reconstructivă din ianuarie 2016. Pregătirea pe timpul rezidențiatului am desfășurat-o în cadrul clinicii de Chirurgie Plastică-Microchirurgie Reconstructivă a Spitalului Clinic de Urgență București. În această perioadă am participat la numeroase cursuri și manifestări științifice, naționale și internaționale, și am redactat lucrări științifice publicate în reviste de specialitate.
În prezent, practic chirurgia plastică și microchirurgia reconstructivă, în Clinica Zetta, din București.

Dr. Iulia & Dragos
MURARU
CHIRURGIE ESTETICA
SI RECONSTRUCTIVA

PAȘII URMĂTORI

Dacă mai ai întrebări sau dorești să afli mai multe despre intervenția de augmentare mamară, ne poți adresa orice întrebare aici: hello@drmuraru.ro. Noi vom fi bucuroși să te ajutăm cu orice informație necesară.

Următorul pas este simplu: soliciți o consultație cu unul dintre noi, Dr. Iulia Muraru sau Dr. Dragoș Muraru. Te vom prelua și vom fi bucuroși să te cunoaștem și să te ghidăm, astfel încât tu să obții rezultatul dorit și să te simți bine în pielea ta.

PROGRAMEAZĂ-TE LA UN CONSULT:

Telefon:
0752 147 200 - Dr. Iulia Muraru
0752 274 323 - Dr. Dragoș Muraru

Email: hello@drmuraru.ro

Consultațiile și intervențiile se fac în Clinica Zetta, Centrul de Excelență în Chirurgie Plastică Estetică și Microchirurgie Reconstructivă.

Adresa: Strada Ghiță Pădureanu Nr 5, parter, Zona Floreasca, Sector 2, București, C.P. 020031.



Încrederea în sine este cel mai puternic atu al unei femei.
Simte-te frumoasă! Simte-te bine în pielea ta!